

Особенности ультразвукового исследования суставов у больных ревматоидным артритом

Е.Б. КОМАРОВА¹, О.А. РЕБРОВА¹, И.И. ПОКРЫШКА², Ю.Г. КИНДРИЦКАЯ²

¹ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Луганск, АНР; ²Луганская республиканская клиническая больница, Луганск, АНР

Резюме

Цель исследования. Изучить особенности ультразвуковых показателей суставов при ревматоидном артите (РА) в зависимости от длительности заболевания.

Материалы и методы. Обследованы 162 пациента, средний возраст $43,54 \pm 11,1$ года, средняя продолжительность РА $3,22 \pm 3,13$ года. Ультразвуковое исследование (УЗИ) суставов кистей и лучезапястных суставов выполняли в режиме серой шкалы и при использовании цветового и энергетического допплеровского исследования. В 1-ю группу включили 78 пациентов с длительностью РА до 2 лет, во 2-ю группу — 84 больных с длительностью РА более 2 лет.

Результаты. У обследованных больных РА по сравнению со стандартным методом рентгенографии при УЗИ суставов в 2 раза чаще диагностировались костно-хрящевые эрозии. У 82% пациентов с РА установлен синовит, у 77% — утолщение синовиальной оболочки (СО) с гиперваскуляризацией, интенсивность васкуляризации преобладала с оценкой 2—3 балла, у 54% — теносиновит сухожильй разгибателей кисти. В 1-й группе больных РА наиболее часто встречались выпот в полость сустава, гиперваскуляризация СО с оценкой 2—3 балла и теносиновиты. Во 2-й группе больных РА преобладали утолщение СО и наличие костно-хрящевых эрозий.

Заключение. У пациентов с длительностью РА до 2 лет при УЗИ суставов преобладают процессы ангиогенеза и воспаления, а у пациентов с длительностью РА более 2 лет — пролиферативно-деструктивные процессы. Выявление преобладания патофизиологических процессов у каждого конкретного пациента с РА позволит индивидуализировать терапию и улучшить прогноз заболевания.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ультразвуковое исследование суставов, длительность заболевания, ангиогенез, деструкции.

Specific features of joint ultrasound study in patients with rheumatoid arthritis

E.B. KOMAROVA¹, O.A. REBROVA¹, I.I. POKRUSHKA², YU.G. KINDRITSKAYA²

¹Lugansk State Medical University, Lugansk, Lugansk People's Republic; ²Lugansk Republican Clinical Hospital, Lugansk, Lugansk People's Republic

Aim. To study the specific features of joint ultrasound readings in rheumatoid arthritis (RA) in relation to its duration.

Subjects and methods. A total of 162 patients (mean age, 43.54 ± 11.1 years) with a mean RA duration of 3.22 ± 3.13 years were examined. Gray-scale ultrasound study (USS) of hand and ankle joints was performed using color Doppler energy imaging. Group 1 included 78 patients with a RA duration of less than 2 years; Group 2 consisted of 84 patients with a RA duration of more than 2 years.

Results. Joint USS diagnosed osteochondral erosions twice more frequently than conventional radiography. 82% of the patients with RA were found to have synovitis; 77% had thickening of the synovial membrane (SM) with hypervascularization, the vascularization intensity scores of 2—3 being predominant; and 54% had tenosynovitis of the carpal extensor tendon. Effusion into the joint cavity, SM hypervascularization scores of 2—3, and tenosynovitis were most common in Group 1. SM thickening and osteochondral erosions were prevalent in Group 2.

Conclusion. Joint USS revealed that angiogenesis and inflammation were dominant in the patients with a RA duration of less than 2 years and the proliferative-destructive processes were prevalent in those with a RA duration of more than 2 years. Identifying the predominance of pathophysiological processes in each specific patient with RA will be able to individualize therapy and to improve the prognosis of the disease.

Keywords: rheumatoid arthritis, joint ultrasound study, disease duration, angiogenesis, destruction.

КГ — контрольная группа
РА — ревматоидный артрит
СО — синовиальная оболочка

СЩ — суставная щель
УЗИ — ультразвуковое исследование

При ревматоидном артите (РА) главной причиной эрозивно-деструктивного процесса является разрушительное действие агрессивно растущего паннуса, рост которого обусловлен ангиогенезом и гиперплазией синовиальной оболочки (СО) сустава, что вызвано активацией провоспалительных цитокинов, факторов роста, молекул адгезии и нарушением апоптоза синовиальных фибробластов [1]. Уже на ранней стадии РА у большинства пациентов развиваются эрозии, у 27% больных признаки потери

трудоспособности выявляются в течение первых 3 лет от дебюта, а более 50% больных теряют работоспособность в течение 5 первых лет заболевания [2]. Поэтому методам ранней диагностики РА уделяется все больше внимания. К инструментальным методам ранней диагностики РА относится ультразвуковое исследование (УЗИ) суставов, которое помогает установить не только эрозивные изменения в суставах, когда костно-хрящевые деструкции при рентгенологическом исследовании не выявляются, но и

выявить патологические изменения мягких тканей сустава и околосуставных структур (утолщение СО, выпот в полость сустава, гиперваскуляризация СО, теносиновиты, наличие паннуса) [3, 4]. Установление особенностей УЗИ суставов при разном клиническом течении РА позволит усовершенствовать диагностику, прогноз и комплексное лечение у больных, что является актуальной задачей современной ревматологии.

Цель исследования: изучить особенности ультразвуковых показателей суставов у больных РА в зависимости от длительности заболевания.

Материалы и методы

В условиях ревматологического отделения Луганской республиканской клинической больницы обследованы 162 пациента с РА (диагноз верифицирован в соответствии с критериями ACR/EULAR, 2010). Всем пациентам проведены клинико-лабораторное исследование, УЗИ суставов кистей и периартикулярных структур мягких тканей. Среди обследованных пациентов 85% составили женщины, средний возраст $43,54 \pm 11,1$ года, средняя продолжительность РА $3,22 \pm 3,13$ года. Контрольную группу (КГ) составили 32 практически здоровых лица в возрасте от 34 до 56 лет ($46,8 \pm 7,8$ года) без признаков заболеваний внутренних органов.

УЗИ суставов кистей и лучезапястных суставов выполняли на аппарате ESAOTE MyLAB 40 (Нидерланды, 2008) с линейным датчиком 7,5 L70 (частота 7,5 МГц) в режиме «ortho», серой шкалы и при использовании цветового и энергетического допплеровского исследования. Методика УЗИ суставов включала оценку суставной щели (СЩ), выпота в СЩ, изменений толщины СО, вакуляризации СО, наличие паннуса, костно-хрящевых эрозий и теносиновитов. Оценку интенсивности вакуляризации СО проводили по методике, предложенной М. Нах и соавт. (1999), включающей 3-балльную шкалу: 0 — отсутствие визуализации паннуса/цветных сигналов на полученном изображении в анализируемой области; 1 — паннус, который незначительно визуализируется, и/или единичные цветные сигналы; 2 — умеренная визуализация паннуса или умеренное количество цветных сигналов; 3 — максимальная визуализация паннуса и/или высокая плотность цветных сигналов, сливаются в полученном изображении и зафиксированы в анализируемой области на продольных и поперечных сканах) [5].

Всех обследованных больных РА распределили на 2 группы: 1-я — 78 пациентов с длительностью РА до 2 лет, 2-я — 84 больных с длительностью РА более 2 лет. Пациенты обеих групп статистически значимо не различались по степени активности РА, уровню ревматоидного фактора и показателю HAQ.

Статистический анализ полученных данных проводили в системе Statistica, версии 8.0 («StatSoft.», США). Оценку достоверности результатов исследования осуществляли по критерию χ^2 , различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты

Анализ показателей УЗИ суставов у всех обследованных отображен в табл. 1. У большинства больных РА установлены изменения СЩ за счет ее расширения (наличие суставного выпота), что достоверно отличалось от показа-

телей КГ ($p < 0,001$). Изменения СО имелись у большинства больных РА, практически одинаково часто встречалось и утолщение СО, и наличие кровотока в СО, причем у 76% пациентов с РА имелись эти два показателя одновременно, тогда как в КГ эти признаки встречались значительно реже ($p < 0,001$).

У больных РА оценка интенсивности вакуляризации СО имела тенденцию к равнозначному распределению баллов: не зафиксировано кровотока у 19% больных, преобладали умеренные сигналы с оценкой 1 балл (30%) и 2 балла (26,5%), цветные сигналы высокой плотности зафиксированы у 24,5% больных. В КГ только в 3% случаев зафиксированы умеренные сигналы с оценкой 1 балл. По всем балльным градациям между группами различия высокодостоверны ($p < 0,001$).

У большинства больных РА при УЗИ выявлен паннус — формирование морфологической основы костной деструкции (гипертрофированная СО с интенсивной вакуляризацией), что достоверно отличалось от показателя КГ ($p < 0,001$).

Ультразвуковые признаки изменений костно-хрящевых суставных поверхностей заключались в неровности и/или нечеткости контуров кортикального слоя, наличии мелких дефектов последнего, достоверных эрозий или остеофитов. При УЗИ достоверные костно-хрящевые эрозии выявлены у 82% больных РА, а при рентгенологическом исследовании — только в 43% случаях.

У больных РА наиболее часто встречалось поражение сухожилий мышц — разгибателей кистей (теносиновиты). Ультразвуковые признаки теносиновитов в виде расширенной гипоэхогенной/анэхогенной участка вокруг сухожилия, и/или увеличение толщины сухожилия, а также нарушение их целостности — поверхностные дефекты или изменение типовой эхо-структуры сухожилий — зафиксированы у большинства больных РА, что достоверно отличалось от КГ ($p < 0,001$).

При анализе ультразвуковых признаков изменений суставов в зависимости от длительности течения РА (табл. 2) установлено, что у значительного большинства больных как в 1-й, так и во 2-й группах имелись изменения СЩ. Расширение СЩ за счет выпота в полость сустава в 1-й группе встречалось на 10% чаще, чем во 2-й, однако различия недостоверны. Сужение СЩ за счет увеличения объема паннуса и толщины СО приобретало достоверные различия между группами; так, этот показатель превалировал во 2-й группе ($p < 0,05$). Выпот в СЩ встречался чаще, практически на 20%, у больных 1-й группы, и достоверно отличался от показателей 2-й группы ($p < 0,05$).

Изменения СО выявлены у большинства пациентов РА в обеих группах, достоверных различий не установлено, однако при распределении по причинам этих изменений выявлено, что утолщение СО чаще встречалось во 2-й группе ($p < 0,05$), а кровотока в СО — чаще у больных 1-й группы ($p < 0,05$).

Анализ оценки интенсивности вакуляризации СО по группам показал (см. табл. 2): больных с оценкой 0 баллов во 2-й группе на 10% больше, но различия недостовер-

Сведения об авторах:

Реброва Ольга Александровна — к.м.н., доц. каф. внутренней медицины фак. последипломного образования

Покрышка Ирина Ивановна — главный ревматолог, зав. ревматологическим отд-ием

Киндицкая Юлия Григорьевна — врач-ординатор отд-ния ультразвуковой диагностики

Контактная информация:

Комарова Елена Борисовна — к.м.н., доц. каф. внутренней медицины факультет последипломного образования; e-mail: elbelcom@ua.fm

Таблица 1. Показатели УЗИ суставов у всех обследованных, *n* число пациентов

Показатель УЗИ суставов	Пациенты с РА (n=162)	КГ (n=32)	Статистические различия	
			χ^2	p
Изменения СЩ:				
сужнение	156 (96,3%)*	3 (9,4%)	130,7	<0,001
расширение	15 (9,25%)	2 (6,25%)	0,04	0,84
Выплюв в СЩ	141 (87%)*	1 (3,1%)	91,7	<0,001
Изменение СО:	132 (81,5%)*	4 (12,5%)	57,6	<0,001
утолщение	151 (93,2%)*	4 (12,5%)	103,4	<0,001
наличие кровотока	122 (75,3%)*	3 (9,4%)	47,8	<0,001
Оценка гиперваскуляризации СО:				
0 баллов	31 (19%)	31 (86,9%)	70,7	<0,001
1 балл	49 (30%)*	1 (3,1%)	8,9	0,003
2 балла	43 (26,5%)*	0	9,43	0,002
3 балла	39 (24,5%)*	0	8,2	0,004
Наличие паннуса	125 (77%)*	1 (3,1%)	61,1	<0,001
Костно-хрящевые эрозии	145 (89,5%)*	2 (6,25%)	96,4	<0,001
Теносиновиты	87 (53,7%)*	2 (6,25%)	22,4	<0,001

Примечание. В табл. 1 и 2 *n* — число пациентов.

Таблица 2. Ультразвуковых признаки изменения в исследуемых группах больных РА

Показатель УЗИ суставов	1-я группа (n=78)	2-я группа (n=84)	Статистические различия	
			χ^2	p
Изменения СЩ:				
сужнение	74 (95%)	82 (98%)	0,26	0,6
расширение	3 (3,8%)	12 (14%)	3,98	0,046
Выплюв в СЩ	71 (95,2%)	70 (86%)	3,87	0,05
Изменение СО:	70 (90%)	62 (73,8%)	5,79	0,016
утолщение	72 (92,3%)	81 (96,4%)	0,64	0,42
наличие кровотока	52 (66,7%)	70 (83,5%)	5,18	0,023
Оценка гиперваскуляризации СО:				
0 балла	11 (14%)	20 (24%)	1,88	0,17
1 балл	14 (18%)	35 (42%)	9,69	0,002
2 балла	26 (33%)	17 (20%)	2,92	0,09
3 балла	27 (35%)	12 (14%)	8,07	0,005
Наличие паннуса	59 (76%)	66 (79%)	0,07	0,8
Костно-хрящевые эрозии	64 (82,1%)	81 (96,4%)	7,44	0,006
Теносиновиты	49 (62,8%)	38 (45,2%)	4,35	0,04

ны; с оценкой 1 балл достоверно чаще встречались во 2-й группе ($p<0,01$); с 2 баллами на 13% больше в 1-й группе, но недостоверно; с оценкой 3 балла достоверно превалировали пациенты в 1-й группе ($p<0,01$). Таким образом, в 1-й группе преобладали пациенты с оценкой интенсивности васкуляризации СО 2–3 балла (68% всех обследованных больных в группе), а во 2-й группе — пациенты с оценкой интенсивности васкуляризации 1–2 балла (66% всех обследованных больных в группе).

Число пациентов с паннусом (см. табл. 2), одинаково в двух группах. Больные с костно-хрящевыми эрозиями достоверно чаще встречались во 2-й группе ($p<0,01$), а пациенты с теносиновитами — в 1-й ($p<0,05$).

Обсуждение

УЗИ суставов у больных РА является более чувствительным методом диагностики костно-хрящевых эрозий по сравнению с рентгенологическим методом, что показано рядом авторов [6, 7]. В нашем исследовании при УЗИ

суставов у больных РА костно-хрящевая деструкция диагностировалась в 2 раза чаще, чем стандартным методом рентгенографии.

До сих пор не существует единой стандартизованной оценки показателей при УЗИ суставов, особенностей при различном клиническом течении РА, однако многие исследователи четко показывают, что УЗИ в режиме энергетического допплера позволяет дать более точную характеристику активности воспаления РА, чем клинические индексы активности [8–10].

В нашем исследовании при УЗИ суставов в группе больных с длительностью РА до 2 лет наиболее часто встречались выплюв в полость сустава, интенсивная васкуляризация СО с оценкой 2–3 балла и теносиновиты, характеризующие воспалительные процессы и ангиогенез. В группе больных с длительностью РА более 2 лет преобладали утолщение СО и костно-хрящевые эрозии, характеризующие пролиферативно-деструктивные процессы. Отсутствие различий по оценке показателя формирования паннуса между группами можно объяснить

тем, что в обеих группах были пациенты, которые имели признаки и интенсивного ангиогенеза (гиперваскуляризация СО), и пролиферации (утолщение СО), а паннус и есть гипертрофированная СО с интенсивной васкуляризацией. Выявление преобладания патофизиологических процессов у каждого конкретного пациента с РА позволяет индивидуализировать терапию и улучшить прогноз заболевания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dhaouadi T, Sfar I, Abelmoula L, Jendoubi-Ayed S, Aouadi H, Ben Abdellah T, Ayed K, Zouari R, Gorgi Y. Role of immune system, apoptosis and angiogenesis in pathogenesis of rheumatoid arthritis and joint destruction, a systematic review. *Tunis Med.* 2007;85(12):991-998.
2. Зинчук И.Ю., Амирджанова В.Н. Социальна бремя ревматоидного артрита. *Научно-практическая ревматология* 2014; 52(3):331-335.
doi:10.14412/1995-4484-2014-331-335
3. Волков А.В., Осилянц Р.А. Ультрасонография в ревматологии: возможности применения и перспективы. *Научно-практическая ревматология*. 2010;(4,прил.2):36-41.
4. Fukae J, Tanimura K, Atsumi T, Koike T. Sonographic synovial vascularity of synovitis in rheumatoid arthritis. *Rheumatology (Oxford)* 2014;53(4):586-591.
doi:10.1093/rheumatology/ket311
5. Cimmino MA, Grassi W, Cutolo M. Modern imaging techniques: a revolution for rheumatology practice. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2008;22:951-959.
doi:10.1016/j.beprh.2008.08.00
6. Осилянц Р.А., Каратаев Д.Е., Панасюк Е.Ю., Лукина Г.В., Смирнов А.В., Глухова С.И., Александрова Е.Н., Волков А.В., Насонов Е.Л. Оценка структурных изменений суставов кистей и темпов прогрессирования ревматоидного артрита по данным сонографии. *Научно-практическая ревматология*. 2013;51(2):132-137.
doi:10.14412/1995-4484-2013-639
7. Ten Cate DF, Luime JJ, Swen N, Gerards AH, De Jager MH, Basoski NM, Hazes JM, Haagsma CJ, Jacobs JW. Role of ultrasonography in diagnosing early rheumatoid arthritis and remission of rheumatoid arthritis — a systematic review of the literature. *Arthritis Res Ther.* 2013;15(1):R4.
doi:10.1186/ar4132
8. Алексеева О.Г., Новиков А.А., Северинова М.В., Авдеева А.С., Александрова Е.Н., Лучихина Е.Л., Каратаев Д.Е., Глухова С.И., Волков А.В., Насонов Е.Л. Динамика уровня биомаркеров и ультразвуковые признаки воспаления у пациентов с ревматоидным артритом. *Научно-практическая ревматология*. 2015;53(5):485-492.
doi:10.14412/1995-4484-2015-485-492
9. Zufferey P, Möller B, Brulhart L, Tamborini G, Scherer A, Finckh A, Ziswiler HR. Persistence of ultrasound synovitis in patients with rheumatoid arthritis fulfilling the DAS28 and/or the new ACR/EULAR RA remission definitions: results of an observational cohort study. *Joint Bone Spine.* 2014;81(5):426-432.
doi:10.1016/j.jbspin.2014.04.014
10. Dougados M, Devauchelle-Pensec V, Ferlet JF, Jousse-Joulin S, D'Agostino MA, Backhaus M, Bentin J, Chales G, Chary-Valckenaere I, Conaghan P, Wakefield RJ, Etchepare F, Gaudin P, Grassi W, Heijde D, Marietta X, Naredo E, Szkludlarek M. The ability of synovitis to predict structural damage in rheumatoid arthritis: a comparative study between clinical examination and ultrasound. *Ann Rheum Dis.* 2013;72:665-671.
doi:10.1136/annrheumdis-2012-201469

Заключение

У пациентов с длительностью РА до 2 лет при УЗИ суставов преобладают процессы ангиогенеза и воспаления, а у пациентов с длительностью РА более 2 лет — пролиферативно-деструктивные процессы.

Конфликт интересов отсутствует.

Поступила 16.11.2015